 瑪麗醫院 QUEEN MARY HOSPITAL	Department of Obstetrics and Gynaecology	Document No.	OGO0094(I)-C
		Last review date	Sept 2017
	Subject 剖腹产后再次分娩的选择	Next review date	Sept 2020
		Approved by	Obstetrics Team, QMH
		Page	Page 1 of 2

剖腹产后再次分娩的选择

病人标签

子宫疤痕的类型:

下段 / 涉及上段 / 不知道
(删除不适用者)

前次手术 / 剖腹产记录是否在病人记录内?

是 / 不是

剖腹产后阴道分娩


成功率 (自然作动平均 72-75%成功阴道分娩, 如需催生, 成功率较低)

风险

母亲: 子宫破裂 (罕见, 每 10,000 名产妇中 22-74 人)
 胎儿: 围生期的死亡及疾病, 包括分娩时胎儿死亡 (很少) 和脑瘫 (风险尚未完全确定)
 剖腹产后阴道分娩的围生期胎儿死亡率 (每10,000名婴儿中4人) 比再度剖腹产高, 但与首次分娩产妇相若。

好处(成功的阴道分娩)

母亲: 近期 – 最安全的方法
 复完快
 出血少
 感染机会小
 手术并发症减少
 血管栓塞机会减少
 远期 – 前置胎盘机会减少

 瑪麗醫院 QUEEN MARY HOSPITAL	Department of Obstetrics and Gynaecology	Document No.	OGO0094(I)-C
		Last review date	Sept 2017
	Subject 剖腹产后再次分娩的选择	Next review date	Sept 2020
		Approved by	Obstetrics Team, QMH
		Page	Page 2 of 2

胎盘黏连机会减少

胎儿： 呼吸较佳

再度剖腹产

风险

母亲： 近期 – 手术并发症机会增加 (如器官损伤、出血、伤口并发症)

远期 – 前置胎盘机会增加

胎盘黏连机会增加

子宫破裂机会增加

胎儿： 新生儿呼吸困难

好处

母亲： 降低了因阴道分娩失败而要接受急症手术的病率

胎儿： 降低了新生儿的病率及死亡率

未来再怀孕： 基于此前两次剖腹产史，建议**剖腹产**

我选择阴道分娩 / 我选择再度剖腹产

(病人签名)

(医生姓名及签名)

(日期)