 瑪麗醫院 QUEEN MARY HOSPITAL	Department of Obstetrics and Gynaecology	Document No.	OGO0094(I)-C
		Last review date	Sept 2017
	<b>Subject</b> 剖腹產後再次分娩的選擇	Next review date	Sept 2020
		Approved by	Obstetrics Team, QMH
		Page	Page 1 of 2

## 剖腹產後再次分娩的選擇

病人標籤

子宮疤痕的類型：

下段 / 涉及上段 / 不知道  
(刪除不適用者)

前次手術 / 剖腹產記錄是否在病人記錄內？

是 / 不是

### 剖腹產後陰道分娩

成功率 (自然作動平均 72-75% 成功陰道分娩，如需催生，成功率較低)

### 風險

母親： 子宮破裂 (罕見，每 10,000 名產婦中 22-74 人)

胎兒： 圍生期的死亡及疾病，包括分娩時胎兒死亡 (很少) 和腦癱 (風險尚未完全確定)

剖腹產後陰道分娩的圍生期胎兒死亡率 (每10,000名嬰兒中4人) 比再度剖腹產高，但與首次分娩產婦相若。

### 好處(成功的陰道分娩)

母親： 近期 – 最安全的方法

復完快


出血少

感染機會小

手術併發症減少

血管栓塞機會減少

遠期 – 前置胎盤機會減少

 瑪麗醫院 QUEEN MARY HOSPITAL	Department of Obstetrics and Gynaecology	Document No.	OGO0094(I)-C
	<b>Subject</b> 剖腹產後再次分娩的選擇	Last review date	Sept 2017
		Next review date	Sept 2020
		Approved by	Obstetrics Team, QMH
		Page	Page 2 of 2

胎盤黏連機會減少

胎兒： 呼吸較佳

## 再度剖腹產

### 風險

母親： 近期 – 手術併發症機會增加 (如器官損傷、出血、傷口併發症)

遠期 – 前置胎盤機會增加

胎盤黏連機會增加

子宮破裂機會增加

胎兒： 新生兒呼吸困難

### 好處

母親： 降低了因陰道分娩失敗而要接受急症手術的病率

胎兒： 降低了新生兒的病率及死亡率

未來再懷孕： 基於此前兩次剖腹產史，建議剖腹產

## 我選擇陰道分娩 / 我選擇再度剖腹產

\_\_\_\_\_  
 (病人簽名)

\_\_\_\_\_  
 (醫生姓名及簽名)

\_\_\_\_\_  
 (日期)