



Affix patient's label if available

Patient Name

Hospital Number

HKID No.

Sex/ Age

Ward/ Bed

同意接受羊膜穿刺须知

Document No. OGP0002(I)-SC

Approved by: Prenatal Diagnostic and Counselling Division, TYH

适应症:

- 产前唐氏综合症筛查测试呈阳性
- 其他 _____

羊水是用来检查下列疾病 / 情况

胎儿有上述疾病 / 情况的机会是

_____ (请注明估计的机会)

羊膜穿刺程序:

- 用幼针穿过产妇肚皮, 子宫壁及羊膜, 抽取羊水作测试。
- 不需要麻醉。
- 会用超声波监察穿刺及抽取过程。

羊水将用作以下测试:

- 染色体检查
- 传统细胞遗传学 (需要三星期时间有报告, 将检查所有染色体, 可确诊胎儿是否有唐氏综合症及其他染色体数量异常的病, 但不能排除微小的染色体缺失, 重复或倒排等问题, 也不能排除基因异常引起的遗传病和其他先天异常。)
- 快速测试 (需要三工作天时间有报告, 将检查部份指定染色体, 可初步检查该染色体数目的异常, 但不能排除微小的染色体缺失, 重复或倒排, 或镶嵌性染色体异常等问题。也不能排除基因异常引起的遗传病和其他先天异常等问题。)
- 其他: _____

(注明何种测试, 目的及局限)

羊膜穿刺的风险:

- 0.1 - 0.2% 的产妇会在进行羊膜穿刺后流产。
- 14 周以前做羊膜穿刺会增加胎儿的呼吸问题及关节畸形。
- 子宫内感染: 一般来说, 因产前入侵性检验而引致胎儿子宫内感染的机会很低, 但是乙型肝炎或艾滋病毒携带者的胎儿便有机会因入侵性检验而受感染。故此, 可考虑等候以上报告有结果后才进行入侵性检验。如急于进行羊膜穿刺检验, 便须冒胎儿受子宫内感染的风险。
- 其他严重并发症很罕见。



Affix patient's label if available

Patient Name

Hospital Number

HKID No.

Sex/ Age

Ward/ Bed

同意接受羊膜穿刺须知

羊膜穿刺后的护理:

- 当天不要作剧烈运动或粗重工作。
- 不需要卧床休息。
- 任何时间出现阴道出血、流水、腹痛或发烧，应立刻请教医生或到就近急症室求诊。

如果我不接受羊膜穿刺会有什么后果?

- 你可能不会得到确诊胎儿健康情况的数据。例如，不做染色体测试便不能在产前确诊胎儿是否有唐氏综合症。
- 因个别情况而异的具体后果。（请注明） _____

羊膜穿刺以外的其他选择? (请删去不适用者)

- 如果之前没作唐氏综合症筛查测试，你可考虑先作筛查测试。筛查测试可检出 70-90%的唐氏综合症胎儿，但不能保证胎儿一定没有唐氏综合症。（如已接受筛查并且是阳性，或羊膜穿刺的目的非为唐氏综合症测试。请删去此项）
- 绒毛膜活检或脐带穿刺。
- 详细的超声波检查可能会提供一些关于胎儿的数据，但一般不能确诊你需要确诊的病症。例如，超声波检查可显示胎儿有唐氏综合症的机会较低或较高，但不能确诊胎儿是否有唐氏综合症。
- 婴儿出生后的体格检查或其他测试，亦可以确诊病症。
- 其他: _____

其他讨论: (如有)

我 同意 / 不同意 于检测完成后以不记名形式储存我的羊水样本，以作为学术研究或刊载之用。我明白所提供的个人资料及测试结果均绝对保密。

孕妇签署: _____

日期: _____

Please refer to <http://hkwc.home/webapps/Dept/HIRO> for details of full version. Prepared by HIRO QMH.

Form No.: PRF03019(2.15) Eng PRF03020

Review date: Sep 2016

Next review date: Sep 2019

Form owner: Obs