 瑪麗醫院 QUEEN MARY HOSPITAL	Department of Obstetrics and Gynaecology	Document No.	OGOB0007(I)-SC
		Last review date	Sept 2017
	Subject 子宫下段剖宫产(手术资料)	Next review date	Sept 2020
		Approved by	Obstetrics Team, QMH
		Page	Page 1 of 2

香港大学妇产科学系

子宫下段剖腹产(手术资料)

适应症： _____

手术步骤


- 全身麻醉 / 区域麻醉
- 耻骨联合上横切口 / 下腹部正中纵切口
- 进入腹腔
- 分离膀胱与子宫
- 由子宫下段横切口进入宫腔
- 娩出胎儿，必要时使用产钳
- 娩出胎盘
- 缝合子宫切口和腹壁切口
- 手术期间可能会拍照或录影以供记录 / 研究 / 教学用途(如有反对，请向医护人员提出)

手术影响

- 存在腹部伤口
- 不影响母乳饲，但开始时比自然分娩的产妇较困难
- 不影响性交
- 不影响再次生育，但随后的妊娠可能存在某些并发症(详见后述)

重要风险及并发症 (未能尽录)

- 麻醉并发症
- 大出血，可能需要输血 (0.5%)
- 损伤邻近器官，特别是膀胱，输尿管和肠道 (0.1%)
- 划伤新生儿皮肤 (1%)
- 新生儿湿肺 (3-4%；如在 38 周前进行手术，机会率会增加)
- 伤口并发症 (包括感染约 2%和小肠气)
- 子宫感染(1%)
- 血栓塞并发症 (<1%)

 瑪麗醫院 QUEEN MARY HOSPITAL	Department of Obstetrics and Gynaecology	Document No.	OGOB0007(I)-SC
		Last review date	Sept 2017
	Subject 子宫下段剖宫产(手术资料)	Next review date	Sept 2020
		Approved by	Obstetrics Team, QMH
		Page	Page 2 of 2

胎盘胎膜滞留

需要再次手术，如开腹手术，吸宫术（0.5%）

如果出血不能控制，有切除子宫可能（0.8%）

随后妊娠的影响

建议住院分娩

首次剖宫产后阴道分娩的成功率 约 72-76%

子宫疤痕破裂的风险

前置胎盘及胎盘植入的风险轻微升高

如果曾两次剖宫产，建议再次剖宫产手术分娩

如你在安排的剖腹手术前作动，你的产科医生会跟你商讨进行手术的安全性。如果胎儿即将出生，可能阴道分娩对你及胎儿都比较安全。

剖宫产以外的处理方法（如适用）：

不接受手术的风险是：

有关手术 / 程序的情况医务人员向我解释清楚。此病的治疗方案及有关疑问也给予我满意答复。

病人标签

签署 _____

日期 _____